

# IMMER IM BLICK: VERDÄCHTIGE CUSHING-SYMPTOME



## CUSHING-SYNDROM BEHANDLUNGSTAGEBUCH

Das Behandlungstagebuch unterstützt Sie bei der Beweisaufnahme. Und hilft Ihrem Tierärzte-Team bei der Therapiekontrolle. Vom Harnabsatz bis zur Fitness Ihres Hundes – je genauer Sie dokumentieren, desto besser.

Hinweis für das Praxisteam: Diese Broschüre ist ausschließlich zur Abgabe an Hundebesitzer vorgesehen, deren Hunde mit dem Tierarzneimittel Vetoryl® behandelt werden.



# Behandlungstagebuch

Halten Sie in diesem Tagebuch die Fortschritte Ihres Hundes während der Therapie mit Vetoryl® fest. Denn mit einer gut eingestellten Therapie können Sie die Lebensfreude und Energie Ihres Hundes steigern. Auch das Risiko Folgeerkrankungen zu entwickeln, ist geringer.

**Viele Cushing-Symptome werden im Laufe der Therapie verschwinden oder gut unter Kontrolle sein.**

Für eine umfassende Beurteilung Ihres Hundes gibt es vier wichtige klinische Parameter. Diese behalten Sie im Blick:

## Trinkverhalten und Harnabsatz

- Das Cushing-Syndrom führt bei den meisten Hunden dazu, dass sie mehr trinken und urinieren. Achten Sie darauf, wie oft Sie den Wassernapf auffüllen müssen, wie häufig Sie Ihren Hund trinken sehen, ob Ihr Hund Nachts raus muss oder ins Haus pinkelt.



## Appetit

- Der Cortisol-Überschuss aufgrund des Cushing-Syndroms macht Hunde sehr hungrig. Für die Beurteilung ist wichtig, wie schnell Ihr Hund seine Futtermenge verzehrt, wie oft und wie vehement er nach mehr Futter oder Leckerli verlangt.



## Aussehen

- Fell: Einige Hunde mit Cushing-Syndrom zeigen Haarausfall oder das Fell wird trocken und brüchig.
- Haut: Cushing-Hunde haben oft trockene und schuppige Haut, die dünn und gespannt erscheinen kann.
- Hängebauch: Ihr Hund kann um die Taille herum rund aussehen.



## Verhalten/Aktivität

- Viele Hunde mit Cushing-Syndrom sind müde und antriebslos. Achten Sie darauf, wie gern und häufig Ihr Hund spielt, Gassi geht, sich zurückzieht oder schläft.



# So unterstützen Sie die Therapie für Ihren Hund:

Für Ihr Tierärzte-Team ist es enorm wichtig, ein umfassendes Bild zu bekommen, wie Ihr Hund die Therapie verträgt und ob sich die Symptome verbessern. Durch Kontrolluntersuchung lässt sich feststellen, ob die Vetoryl®-Dosis richtig eingestellt ist oder an die Bedürfnisse Ihres Hundes angepasst werden muss. Außerdem ist durch die regelmäßige Überwachung schnell erkennbar, wenn sich Ihr Hund mit der Therapie unwohl fühlt.

Reagiert Ihr Hund auf die Therapie mit Schwäche, Erbrechen, Durchfall oder Appetitlosigkeit? Dann brechen Sie bitte sofort ab und kontaktieren Ihre Tierarztpraxis.

Bitte halten Sie alle Fortschritte und Veränderungen Ihres Hundes fest. Füllen Sie dazu einfach vor jedem Kontrolltermin den **Fragebogen zum klinischen Bild** aus. Diesen finden Sie auf den Seiten 6 – 13.

## Beurteilung der Lebensqualität

Die Beurteilung der Lebensqualität hilft Bereiche aufzuzeigen, die noch verbessert werden können. Füllen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen den Fragebogen zur Lebensqualität aus. Denn dieser beurteilt, wie stark sich die Cushing-Krankheit auf Sie und Ihren Hund auswirkt.

Die **Fragebögen zur Lebensqualität** finden Sie im hinteren Teil des Behandlungstagebuchs. Empfehlung: alle 3 Monate ausfüllen und die Ergebnisse mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt besprechen.



# Steckbrief meines Hundes

Name: \_\_\_\_\_

Rasse: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geschlecht: männlich/weiblich      Kastration: ja/nein

Tierarzt/Tierärztin: \_\_\_\_\_

Name der Praxis: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

## Die nächsten Termine meines Hundes:

| Datum | Uhrzeit | Grund des Termins | Notizen zum Termin (Änderung der Dosis, der Häufigkeit der Gabe etc.) |
|-------|---------|-------------------|---|
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |
|       |         |                   |   |



# Cushing – Bewertung des klinischen Bildes

Diese Bewertungen sind für die optimale Therapieeinstellung Ihres Hundes sehr wichtig. Beurteilen Sie daher bitte vor jedem Kontrolltermin folgende klinische Parameter. Wählen Sie dafür einfach die Zahl, die am besten beschreibt, wie es Ihrem Hund aktuell geht.



## Trinkverhalten und Urinabsatz

- 0 = Trinkt und uriniert normal viel
- 1 = Trinkt und uriniert etwas mehr
- 2 = Trinkt und uriniert mehr
- 3 = Trinkt und uriniert deutlich mehr



## Appetit

- 0 = Frisst normal viel
- 1 = Hat mehr Appetit
- 2 = Hat mehr Appetit und bettelt nach Futter
- 3 = Hat ständig Heißhunger



## Aussehen

- 0 = Aussehen normal
- 1 = Mäßige Haut- und Haarqualität
- 2 = Schlechte Haut- und Haarqualität und/oder Hängebauch
- 3 = Erheblicher Haarverlust und/oder deutlicher Hängebauch



## Verhalten/Aktivität

- 0 = Verhalten/Aktivität normal
- 1 = Verhalten/Aktivität etwas reduziert
- 2 = Verhalten/Aktivität reduziert und/oder hechelt in Ruhe
- 3 = Verhalten/Aktivität reduziert und/oder hechelt durchgehend in Ruhe

Mehr Informationen zur Beurteilung des klinischen Bildes  
finden Sie auf [www.cushingverdacht.de](http://www.cushingverdacht.de) und  
[www.cushingverdacht.at](http://www.cushingverdacht.at)

## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Tipp: Damit Ihr Hund den Wirkstoff besser aufnehmen kann, verabreichen Sie Vetoryl® zusammen mit dem Futter.**

## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Schon gewusst? Vetoryl® wirkt nur einen Tag. Und wird daher in der Regel einmal täglich verabreicht. Sollte mit dieser Dosis nicht die erwartete Wirkung erzielt werden, kann Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt anordnen, dass die Dosis auf zwei tägliche Gaben verteilt wird.**



## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Tipp: Notieren Sie die Tageszeit, zu der die Symptome bei Ihrem Hund am schlimmsten sind. Muss er z. B. gegen Abend oder nachts öfter raus? Besprechen Sie Ihre Beobachtungen mit Ihrem Tierärzte-Team.**

## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Schon gewusst? Das Cushing-Syndrom kann weitere ernsthafte Erkrankungen auslösen. Z. B. Diabetes, Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder Bluthochdruck. Um Folgeerkrankungen frühzeitig aufzudecken, vereinbaren Sie bitte regelmäßige Kontrolltermine in Ihrer Tierarztpraxis.**

## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Erfahren Sie mehr zum Cushing-Syndrom! In der ausführlichen Broschüre für Hundebesitzer lesen Sie viele nützliche Informationen dazu.**





# Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



Erfahren Sie von betroffenen Hundehalterinnen, wie sich ihre Hunde mit der Vetoryl®-Therapie verändert haben.



Deutschland



Österreich

## Das klinische Bild meines Hundes

| Datum | Vetoryl®-Dosis | Häufigkeit der Gabe | Klinische Beurteilung (Bewertung 0-3) |         |          |                     | Weitere Auffälligkeiten<br>(z.B. Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) |
|-------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------------|--|
|       |                |                     | Trinkverhalten/<br>Harnabsatz         | Appetit | Aussehen | Verhalten/Aktivität |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |
|       |                |                     |                                       |         |          |                     |  |



**Bitte beachten Sie: Wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, sollten Sie den Umgang mit den Vetoryl®-Kapseln vermeiden.**

# Cushing - Bewertung der Lebensqualität

|  | Niemals  | Gelegentlich | Häufig   | Durchgehend     |
|--|----------|--------------|----------|-----------------|
| <b>KLINISCHE ANZEICHEN</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Mein Hund ist extrem durstig   |          |              |          |                 |
| Mein Hund uriniert ins Haus oder muss nachts raus  |          |              |          |                 |
| Mein Hund hat ständig Heißhunger   |          |              |          |                 |
| Mein Hund hechelt übermäßig viel   |          |              |          |                 |
| <b>VERHALTEN</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Mein Hund ist zurückgezogen und ruhig  |          |              |          |                 |
| Mein Hund hat keine Energie  |          |              |          |                 |
| Mein Hund möchte keinen Kontakt zu Menschen/Hunden   |          |              |          |                 |
| Mein Hund spielt nicht gern mit mir  |          |              |          |                 |
| Mein Hund erscheint desorientiert/verwirrt   |          |              |          |                 |
| <b>ALLGEMEINE KÖRPERLICHE VERFASSUNG</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Ich kämpfe mit dem Gewicht meines Hundes   |          |              |          |                 |
| Das Fell meines Hundes hat eine schlechte Qualität (z.B. stumpf, kahle Stellen)                |          |              |          |                 |
| Die Haut meines Hundes ist schlecht (z.B. trocken, dünn)                                       |          |              |          |                 |
| Mein Hund ist in schlechter körperlicher Verfassung (z.B. Verlust der Muskelmasse, Hängebauch) |          |              |          |                 |
| Mein Hund kann keine weiten Strecken laufen  |          |              |          |                 |
| <b>IHRE SITUATION ALS BESITZER</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Ich mache mir über die Gesundheit meines Hundes Sorgen   |          |              |          |                 |
| Der Tagesablauf von mir und meinem Hund ist gestört  |          |              |          |                 |
| Ich fühle mich mit der Betreuung meines Hundes überfordert                                     |          |              |          |                 |
| Die Bindung meines Hundes an mich ist schlechter   |          |              |          |                 |
| Das veränderte Aussehen meines Hundes wird negativ kommentiert                                 |          |              |          |                 |
| <b>DATUM</b>   |          |              |          | <b>ERGEBNIS</b> |



# Cushing - Bewertung der Lebensqualität

|  | Niemals  | Gelegentlich | Häufig   | Durchgehend     |
|--|----------|--------------|----------|-----------------|
| <b>KLINISCHE ANZEICHEN</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Mein Hund ist extrem durstig   |          |              |          |                 |
| Mein Hund uriniert ins Haus oder muss nachts raus  |          |              |          |                 |
| Mein Hund hat ständig Heißhunger   |          |              |          |                 |
| Mein Hund hechelt übermäßig viel   |          |              |          |                 |
| <b>VERHALTEN</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Mein Hund ist zurückgezogen und ruhig  |          |              |          |                 |
| Mein Hund hat keine Energie  |          |              |          |                 |
| Mein Hund möchte keinen Kontakt zu Menschen/Hunden   |          |              |          |                 |
| Mein Hund spielt nicht gern mit mir  |          |              |          |                 |
| Mein Hund erscheint desorientiert/verwirrt   |          |              |          |                 |
| <b>ALLGEMEINE KÖRPERLICHE VERFASSUNG</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Ich kämpfe mit dem Gewicht meines Hundes   |          |              |          |                 |
| Das Fell meines Hundes hat eine schlechte Qualität (z.B. stumpf, kahle Stellen)                |          |              |          |                 |
| Die Haut meines Hundes ist schlecht (z.B. trocken, dünn)                                       |          |              |          |                 |
| Mein Hund ist in schlechter körperlicher Verfassung (z.B. Verlust der Muskelmasse, Hängebauch) |          |              |          |                 |
| Mein Hund kann keine weiten Strecken laufen  |          |              |          |                 |
| <b>IHRE SITUATION ALS BESITZER</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>     | <b>2</b> | <b>3</b>        |
| Ich mache mir über die Gesundheit meines Hundes Sorgen   |          |              |          |                 |
| Der Tagesablauf von mir und meinem Hund ist gestört  |          |              |          |                 |
| Ich fühle mich mit der Betreuung meines Hundes überfordert                                     |          |              |          |                 |
| Die Bindung meines Hundes an mich ist schlechter   |          |              |          |                 |
| Das veränderte Aussehen meines Hundes wird negativ kommentiert                                 |          |              |          |                 |
| <b>DATUM</b>   |          |              |          | <b>ERGEBNIS</b> |

# Cushing - Bewertung der Lebensqualität

|  | Niemals | Gelegentlich | Häufig | Durchgehend |
|--|---------|--------------|--------|-------------|
| KLINISCHE ANZEICHEN                              | 0       | 1            | 2      | 3           |
| Mein Hund ist extrem durstig                     |         |              |        |             |
| Mein Hund urinert ins Haus oder muss nachts raus |         |              |        |             |
| Mein Hund hat ständig Heißhunger                 |         |              |        |             |
| Mein Hund hechelt übermäßig viel                 |         |              |        |             |

| VERHALTEN  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|---|---|
| Mein Hund ist zurückgezogen und ruhig              |   |   |   |   |
| Mein Hund hat keine Energie                        |   |   |   |   |
| Mein Hund möchte keinen Kontakt zu Menschen/Hunden |   |   |   |   |
| Mein Hund spielt nicht gern mit mir                |   |   |   |   |
| Mein Hund erscheint desorientiert/verwirrt         |   |   |   |   |

| ALLGEMEINE KÖRPERLICHE VERFASSUNG  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|---|---|
| Ich kämpfe mit dem Gewicht meines Hundes   |   |   |   |   |
| Das Fell meines Hundes hat eine schlechte Qualität (z.B. stumpf, kahle Stellen)                |   |   |   |   |
| Die Haut meines Hundes ist schlecht (z.B. trocken, dünn)                                       |   |   |   |   |
| Mein Hund ist in schlechter körperlicher Verfassung (z.B. Verlust der Muskelmasse, Hängebauch) |   |   |   |   |
| Mein Hund kann keine weiten Strecken laufen  |   |   |   |   |

| IHRE SITUATION ALS BESITZER                                    | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|---|---|
| Ich mache mir über die Gesundheit meines Hundes Sorgen         |   |   |   |   |
| Der Tagesablauf von mir und meinem Hund ist gestört            |   |   |   |   |
| Ich fühle mich mit der Betreuung meines Hundes überfordert     |   |   |   |   |
| Die Bindung meines Hundes an mich ist schlechter               |   |   |   |   |
| Das veränderte Aussehen meines Hundes wird negativ kommentiert |   |   |   |   |

| DATUM | ERGEBNIS |
|-------|----------|
|-------|----------|

Hier erhalten Sie Hinweise zur Beurteilung Ihrer Ergebnisse. Einfach QR-Code scannen.





Für mehr Informationen zum Cushing-Syndrom  
Ihres Hundes besuchen Sie

**[www.cushingverdacht.de](http://www.cushingverdacht.de)  
oder [www.cushingverdacht.at](http://www.cushingverdacht.at)**



Für Fälle in Deutschland



Für Fälle in Österreich

Ihre Tierarztpraxis:

Vetory® enthält den Wirkstoff Trilostan.

100% Recyclingpapier. Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert.

**Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH • D-88323 Aulendorf • [www.dechra.de](http://www.dechra.de)**  
**Dechra Veterinary Products GmbH • A-6850 Dornbirn • [www.dechra.at](http://www.dechra.at)**

September 2022 • IWA\_MS • Best.-Nr.: 000.0000